



**КонсультантПлюс**

Распоряжение Комитета по  
здравоохранению Администрации  
Санкт-Петербурга и Центра  
Государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора в  
Санкт-Петербурге от 26.11.1998 N 246-р/7-р  
(ред. от 07.10.2008)  
"О совершенствовании работы по раннему  
выявлению и специфической профилактике  
туберкулеза в Санкт-Петербурге"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 04.03.2024

**АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
N 246-р**

**ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
N 7-р**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 26 ноября 1998 года**

**О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ  
И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

Список изменяющих документов  
(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ Комитета по здравоохранению  
Санкт-Петербурга от 07.10.2008 N 571-р)

Ситуация по заболеваемости туберкулезом в Санкт-Петербурге остается напряженной. Продолжается рост показателей, характеризующих распространенность заболевания, в т.ч. рост заболеваемости туберкулезом детей и подростков. Только за последний год заболеваемость детей увеличилась в 1,5 раза и составила в 1997 г. 16,0 на 10 тыс. детского населения, что на 25% выше, чем в среднем по России (12,8). Заболеваемость подростков за 1997 г. возросла на 12% и составила 20,1 на 100 тыс. населения. Сохраняется тенденция поражения лиц молодого возраста. Увеличился в 1997 г. на 74% наиболее объективный показатель - инфицированность детей.

Приведенные данные, нарастание в городе резервуара туберкулезной инфекции, особенно неизвестных источников инфекции, делают прогноз заболеваемости туберкулезом детей и подростков неблагоприятным.

В этих условиях повышается роль туберкулинодиагностики и специфической профилактики туберкулеза. С помощью туберкулинодиагностики ежегодно выявляется до 85% больных туберкулезом детей. Охват прививками БЦЖ детей на первом году жизни остается высоким и достигает 97%, из них 88% новорожденных в 1997 г. вакцинированы против туберкулеза в родильном доме.

В связи с вышеизложенным в целях стабилизации заболеваемости туберкулезом, в первую очередь среди детей и подростков:

1. Утвердить:

[Методические рекомендации](#) о тактике раннего выявления и иммунизации против туберкулеза и других инфекционных болезней (приложение 1).

2. Руководителям органов управления здравоохранением территориальных управлений

---

административных районов, руководителям государственных и ведомственных учреждений здравоохранения:

2.1. Взять под особый контроль работу по раннему выявлению и специфической профилактике туберкулеза.

2.2. Обеспечить проведение ежегодной туберкулезодиагностики и специфической профилактики туберкулеза всем подлежащим контингентам.

2.3. Обеспечить вакцинацию против туберкулеза новорожденных детей при ранней выписке из роддома и в отделениях недоношенных. Приказ и график на проведение туберкулиновых проб и прививок БЦЖ ежегодно направлять главным врачам Центров госсанэпиднадзора в районах и противотуберкулезных диспансеров.

2.4. Иметь в наличии постоянный запас туберкулина, вакцины БЦЖ и БЦЖ-М, а также одноразовых туберкулиновых шприцев, исключить из употребления инсулиновые шприцы. Обеспечить поликлиники безыгольными инъекторами БИ-1М.

2.5. Контролировать своевременность направления к фтизиатру детей и подростков с подозрением на инфицирование микобактериями туберкулеза (МБТ), а также детей из группы "риска" по туберкулезу.

2.6. Анализировать 2 раза в год результаты туберкулинодиагностики и специфической профилактики БЦЖ на основе учетной документации (Ф063/у и Ф064/леч), данные направлять в ЦГСЭН в районах, противотуберкулезные диспансеры и ИЭОМО КЗ по утвержденной форме в установленные сроки к 20.01 и 20.07.

2.7. Проводить ежегодно профилактические флюорографические обследования подростков с 15 лет.

3. Главному врачу Городского противотуберкулезного диспансера Жемкову В.Ф., главным врачам районных противотуберкулезных диспансеров:

3.1. Повысить уровень организационно-методической работы по раннему выявлению и специфической профилактике туберкулеза.

3.2. Обеспечить качественную подготовку вакцинаторов и контроль за их работой на местах.

3.3. Обеспечить полноценное обследование детей впервые выявленных по туберкулинодиагностике и своевременность проведения им химиопрофилактики.

3.4. Совместно с ЦГСЭН в районах проводить анализ туберкулинодиагностики, специфической профилактики БЦЖ, инфицированности в целом детей и подростков и систематически информировать руководителей ЛПУ и медицинских работников о состоянии профилактики и диагностики туберкулеза.

4. Главным врачам Центров госсанэпиднадзора в районах:

4.1. Обеспечить организационно-методическое руководство по планированию, проведению

---

---

туберкулиновых проб, прививок БЦЖ и контроль за подготовкой и работой бригад вакцинаторов.

4.2. Обеспечить контроль за полнотой выявления и обследования детей и подростков с подозрением на инфицирование микобактериями туберкулеза и своевременным направлением их для дообследования и лечения в противотуберкулезный диспансер.

5. Приказ КЗ и ЦГСЭН в Санкт-Петербурге N 520/256 от 11.11.1997 "О проведении туберкулинодиагностики и специфической профилактики туберкулеза" считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Б.М.Тайца, заместителя главного врача Центра госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге Г.А.Колесникова.

Председатель Комитета  
по здравоохранению  
Администрации Санкт-Петербурга  
Ю.В.Павлов

Главный государственный  
санитарный врач  
по Санкт-Петербургу  
В.И.Курчанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к распоряжению Комитета  
по здравоохранению  
и Центра Госсанэпиднадзора  
в Санкт-Петербурге  
от 26.11.1998 N 246-р/7-р

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ТАКТИКЕ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА И ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Список изменяющих документов  
(в ред. [Распоряжения](#) Комитета по здравоохранению  
от 07.10.2008 N 571-р)

I. Туберкулинодиагностика

Утратил силу. - [Распоряжение](#) Комитета по здравоохранению от 07.10.2008 N 571-р.

---

## II. Вакцинопрофилактика

Утратил силу. - [Распоряжение](#) Комитета по здравоохранению от 07.10.2008 N 571-р.

## III. Иммунопрофилактика детям и подросткам с туберкулезной инфекцией

Утратил силу. - [Распоряжение](#) Комитета по здравоохранению от 07.10.2008 N 571-р.

## IV. Оформление на работу лиц декретированных профессий

Оформление на работу лиц декретированных профессий должно производиться только после предварительного обследования на туберкулез в противотуберкулезном диспансере (проба Манту с 2ТЕ, флюорография и т.д.).

Лица, устраивающиеся на работу в противотуберкулезные учреждения, при отрицательной пробе Манту с 2ТЕ подлежат обязательной ревакцинации БЦЖ независимо от возраста, с последующей изоляцией из контакта с бактериовыделителями на 2 месяца.

Методические рекомендации составлены на основании приказа МЗиМП РФ N 324 от 22.11.1995 "О совершенствовании противотуберкулезной помощи населению РФ", приказа МЗ РФ N 375 от 18.12.1997 "О календаре профилактических прививок", приказа МЗ РФ N 345 от 25.11.1997 "О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах", письма МЗ РФ N 2510/2801-98-32 от 27.03.1998 "О внедрении приказа МЗ РФ N 375 от 18.12.1997 "О календаре профилактических прививок", письма МЗ РФ N 133/8-39 от 14.04.1998 "Современные подходы к вопросам вакцинопрофилактики и раннего выявления туберкулезной инфекции у детей", [приказ](#) МЗ СССР N 555 от 29.09.1989 "О совершенствовании системы медосмотров трудящихся", инструкция МЗ СССР N 1142а-73 от 28.12.1979 "О проведении обязательных профилактических осмотров на туберкулез и порядке допуска к работе в некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом", методические указания МЗ и МП РФ ГК СЭН от 22.02.1996 N 95/42 "Организация дифференцированного флюорографического обследования населения с целью выявления заболеваний органов грудной полости".